



POS 5.2 AIGUILLES ET INJECTIONS

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle. Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre tous les éléments exigés.

NIS: _____

Gestionnaire du site: _____ Personne responsable: _____

PROTOCOLE

	Les personnes responsables des injections doivent suivre ce protocole chaque fois qu'elles administrent une injection à un porc.	S'applique à la ferme	Importance																								
1	Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont convenablement formées.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire																								
2	Utiliser seulement des aiguilles détectables.	<input type="checkbox"/>																									
3	Les injections pour les porcs non reproducteurs sont administrées uniquement dans le cou.	<input type="checkbox"/>																									
4	Les injections dans la hanche sont uniquement administrées aux porcs reproducteurs.	<input type="checkbox"/>																									
5	Toutes les autres injections doivent être administrées conformément aux directives du vétérinaire détenteur d'un droit de pratique.	<input type="checkbox"/>																									
6	<p>Le calibre et la longueur de l'aiguille doivent tous deux être appropriés à la taille du porc et au site d'injection : *</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taille du porc</th> <th>Calibre de l'aiguille</th> <th>Longueur de l'aiguille (en pouces)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Porc adulte</td> </tr> <tr> <td>> 125 kg</td> <td>16</td> <td>1-1/2</td> </tr> <tr> <td>De 30 à 125 kg</td> <td>16</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 ou 18</td> <td>1 ou 3/4</td> </tr> <tr> <td>10 kg</td> <td>18</td> <td>3/4</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>18 ou 20</td> <td>1/2, 5/8 ou 3/4</td> </tr> <tr> <td>Porcelet</td> <td>20</td> <td>1/2 ou 5/8</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Limite de 10 ml par site d'injection dans le cou d'un porc adulte ; limite de 5 ml dans la hanche. (Consulter la fiche de renseignements – Utilisation des aiguilles et choix du site d'injection).</i></p>	Taille du porc	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (en pouces)	Porc adulte			> 125 kg	16	1-1/2	De 30 à 125 kg	16	1	20 kg	16 ou 18	1 ou 3/4	10 kg	18	3/4	5 kg	18 ou 20	1/2, 5/8 ou 3/4	Porcelet	20	1/2 ou 5/8	<input type="checkbox"/>	
Taille du porc	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (en pouces)																									
Porc adulte																											
> 125 kg	16	1-1/2																									
De 30 à 125 kg	16	1																									
20 kg	16 ou 18	1 ou 3/4																									
10 kg	18	3/4																									
5 kg	18 ou 20	1/2, 5/8 ou 3/4																									
Porcelet	20	1/2 ou 5/8																									

	Les personnes responsables des injections doivent suivre ce protocole chaque fois qu'elles administrent une injection à un porc.	S'applique à la ferme	Importance									
7	Pour minimiser le risque d'abcès au site d'injection :	<input type="checkbox"/>	Obligatoire									
	a. Déterminer la quantité maximale d'une dose par site d'injection selon le produit (Il est recommandé d'utiliser un maximum de 10 ml par site chez un porc adulte et un maximum de 2 ml chez un porcelet) :	<input type="checkbox"/>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Site d'injection</th> <th>Dosage maximal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nom du produit		Site d'injection	Dosage maximal							
	Nom du produit	Site d'injection		Dosage maximal								
	b. Utiliser une technique d'immobilisation convenable.	<input type="checkbox"/>										
c. Administrer l'injection dans une peau propre.	<input type="checkbox"/>											
d. Remplacer l'aiguille lorsque celle-ci est émoussée, épointée ou courbée.	<input type="checkbox"/>											
e. Entreposer les aiguilles, les injecteurs sans aiguille et les médicaments dans un endroit convenable.	<input type="checkbox"/>											
f. Consulter les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien des seringues et des injecteurs sans aiguille.	<input type="checkbox"/>											
8	Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé									