



POS 7.7.2 PORCS NOUVELLEMENT SEVRÉS

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle. Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre toutes les exigences.

NIS : _____

Gestionnaire du site: _____ Personne responsable: _____

Les bonnes pratiques de production ci-dessous servent à minimiser le stress et l'impact sur la santé et le bien-être des porcelets nouvellement sevrés. Repérez celles qui s'appliquent à votre ferme.

PROTOCOLE

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole pendant trois à cinq jours dès l'arrivée et la prise en charge des porcs nouvellement sevrés.	S'applique à la ferme	Importance
1	Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
2	Préparation de la pouponnière		Fortement recommandé
	a. Nettoyer la pouponnière entre les lots conformément à la POS 2.2.1 Procédure d'hygiène des bâtiments.	<input type="checkbox"/>	
	b. S'assurer que les parcs de la pouponnière ont eu le temps de sécher avant d'y loger les porcelets.	<input type="checkbox"/>	
	c. Avant d'amener les porcelets dans une pièce, s'assurer que celle-ci ait atteint une température ambiante adéquate.	<input type="checkbox"/>	
	d. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	
3	Positionnement des porcs		Fortement recommandé
	a. Placer les porcs de même âge et de taille semblable dans le même parc.	<input type="checkbox"/>	
	b. Prévoir un espace supplémentaire adéquat pour loger les porcs malades ou les radets.	<input type="checkbox"/>	

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole pendant trois à cinq jours dès l'arrivée et la prise en charge des porcs nouvellement sevrés.	S'applique à la ferme	Importance
3	c. Lorsque le taux d'agressivité initial diminue (habituellement dans les deux à trois jours), ne pas introduire de nouveaux porcs dans un parc.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	d. Ne pas déplacer les porcs dans d'autres parcs (sauf vers un parc pour porcs malades, au besoin).	<input type="checkbox"/>	
	e. Utiliser des méthodes de manipulation à faible niveau de stress lors du déplacement ou de la manipulation des porcs.	<input type="checkbox"/>	
	f. Autres bonnes pratiques de production : 	<input type="checkbox"/>	
4	Gestion des aliments et de l'eau		Fortement recommandé
	a. S'assurer que les abreuvoirs fonctionnent bien et qu'ils se trouvent à la bonne hauteur.	<input type="checkbox"/>	
	b. Ajuster les distributeurs d'aliments de sorte qu'au moins 60 % de la mangeoire est recouverte d'aliments.	<input type="checkbox"/>	
	c. Offrir les aliments dans des mangeoires ou sur des tapis propres.	<input type="checkbox"/>	
	d. Distribuer des aliments frais au moins deux à trois fois par jour.	<input type="checkbox"/>	
	e. Songer à éclairer les pièces au cours des premières 24 à 48 heures pour permettre aux porcs de trouver leur nourriture plus facilement.	<input type="checkbox"/>	
	f. Identifier et marquer les porcs qui ne se sont pas nourris pour poursuivre leur surveillance.	<input type="checkbox"/>	
g. Autres bonnes pratiques de production : 	<input type="checkbox"/>		

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole pendant trois à cinq jours dès l'arrivée et la prise en charge des porcs nouvellement sevrés.	S'applique à la ferme	Importance
5	Pratiques d'élevage quotidiennes		Fortement recommandé
	a. Faire la tournée des chambres plusieurs fois par jour au cours des 72 heures après le sevrage.	<input type="checkbox"/>	
	b. Surveiller la qualité de l'air.	<input type="checkbox"/>	
	c. Noter la température ambiante et l'ajuster au besoin.	<input type="checkbox"/>	
	d. Observer les porcs pour tout signe de refroidissement.	<input type="checkbox"/>	
	e. Si des signes de refroidissement sont constatés, augmenter la température de la chambre ou ajouter un chauffage d'appoint comme des tapis chauffants.	<input type="checkbox"/>	
	f. Observer les porcs pour déceler d'autres problèmes, tels des signes de maladies ou de blessures.	<input type="checkbox"/>	
	g. Isoler les radets et les porcs malades pour leur administrer un traitement, des soins particuliers et pour poursuivre leur surveillance.	<input type="checkbox"/>	
h. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>		