



POS 7.10 EUTHANASIE



POINT CRITIQUE

NIS: _____

Gestionnaire du site: _____ Personne responsable: _____

IDENTIFICATION DU VÉTÉRINAIRE DÉTENTEUR D'UN DROIT DE PRATIQUE

Cette POS d'euthanasie a été mis au point en consultation avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique avec qui une relation vétérinaire-client-patient est présente.

Nom du vétérinaire: _____

PROTOCOLE

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance								
1	Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées	<input type="checkbox"/>	Obligatoire								
	LISTE DES PERSONNES FORMÉES POUR EUTHANASIER DES PORCS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Stade de production</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nom		Stade de production							
Nom	Stade de production										
2	Entretien de l'équipement servant à l'euthanasie a. L'équipement utilisé pour euthanasier les porcs est nettoyé et entretenu après s'en être servi et avant d'être entreposé, de sorte qu'il soit en bon état de fonctionnement lorsqu'il devra être utilisé à nouveau.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé								
	b. Autres bonnes pratiques de production : <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/>									
3	Préparation à l'euthanasie a. Contenir les animaux qui devront être euthanasiés au besoin.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé								

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance																											
	<p>b. Si le déplacement des porcs risque d'entraîner de la douleur et de la souffrance, il faudra les euthanasier là où ils se trouvent.</p> <p>i. Les porcs ne doivent pas être trainés, poussés, forcés à se déplacer sur des pattes cassées ou lorsque le mouvement entraîne douleur et souffrance.</p>	<input type="checkbox"/>	Obligatoire																											
	<p>c. Autres bonnes pratiques de production :</p>	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé																											
4	<p>Méthodes d'euthanasie</p> <p>a. Euthanasier rapidement les animaux qui doivent l'être et selon les méthodes répertoriées ci-dessous :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégories de porcs (poids)</th> <th>Méthode d'euthanasie principale¹</th> <th>Méthode d'euthanasie de rechange²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Exemple : truies et verrats</i></td> <td><i>pistolet à tige</i></td> <td><i>arme à feu</i></td> </tr> <tr> <td>Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcelets en pouponnière/ sevrés (9 à 32 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcs en croissance (32 à 68 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcs en engraissement (68 à 120 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Truies/verrats (plus de 200 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Se reporter à la Fiche de renseignements sur les méthodes d'euthanasie pour déterminer la méthode d'euthanasie qui est adéquate. ² La méthode principale et la méthode de rechange peuvent être la même. ³ Lors de l'utilisation d'un pistolet à tige, les porcs d'un poids de ≥ 120 kg requièrent une méthode d'euthanasie de rechange (i.e. réappliquer le pistolet à tige, la saignée ou la décérébration) dès que l'animal devient insensible.</p>	Catégories de porcs (poids)	Méthode d'euthanasie principale ¹	Méthode d'euthanasie de rechange ²	<i>Exemple : truies et verrats</i>	<i>pistolet à tige</i>	<i>arme à feu</i>	Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)			Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)			Porcelets en pouponnière/ sevrés (9 à 32 kg)			Porcs en croissance (32 à 68 kg)			Porcs en engraissement (68 à 120 kg)			Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)			Truies/verrats (plus de 200 kg)			<input type="checkbox"/>	Obligatoire
Catégories de porcs (poids)	Méthode d'euthanasie principale ¹	Méthode d'euthanasie de rechange ²																												
<i>Exemple : truies et verrats</i>	<i>pistolet à tige</i>	<i>arme à feu</i>																												
Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)																														
Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)																														
Porcelets en pouponnière/ sevrés (9 à 32 kg)																														
Porcs en croissance (32 à 68 kg)																														
Porcs en engraissement (68 à 120 kg)																														
Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)																														
Truies/verrats (plus de 200 kg)																														

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance
	b. Autres bonnes pratiques de production : _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
5	<p>Confirmation de l'insensibilité</p> <p>a. Évaluer l'insensibilité du porc tout de suite après l'utilisation de la méthode d'euthanasie.</p> <p>i. Méthodes utilisées pour évaluer l'insensibilité : _____ (Exemples : réflexe du nerf cornéen (toucher l'œil), piqûre sur le nez, observation de contraction musculaire suivie de pagayage, absence de respiration, n'essaie pas de se lever.)</p>	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	<p>b. Si le porc présente des signes de retour de la sensibilité, réappliquer immédiatement la mesure d'euthanasie principale ou la mesure de rechange et confirmer l'insensibilité.</p> <p>Si le porc est toujours vivant, mais insensible, attendre que la mort survienne ou appliquer une méthode secondaire (p. ex., saignée ou décérébration) pour confirmer le décès avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place.</p> <p>i. Méthode secondaire utilisée : _____</p>	<input type="checkbox"/>	
	c. Autres bonnes pratiques de production : _____	<input type="checkbox"/>	
6	<p>Confirmation du décès</p> <p>Confirmer le décès dans les cinq minutes après avoir confirmé l'insensibilité, et avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place.</p> <p>Pour confirmer le décès, tous les indices suivants doivent être présents :</p> <p>i. Pupilles fixes et dilatées.</p> <p>ii. Insensible (consulter les méthodes pour confirmer l'insensibilité).</p> <p>iii. Absence de mouvement.</p> <p>iv. Absence de respiration.</p>	<input type="checkbox"/>	Obligatoire

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance
	b. Documentez les porcs euthanasiés dans le Registre des mortalités (R-M).	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	c. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé

REGISTRES

Nom du registre		Importance
R-M	Registre des mortalités	Obligatoire